



Bart D. Williams III, M.D., D.M.D., FACS

www.carolinaofs.com

INSTRUCCIONES PREOPERATORIAS

1. Si es menor de 18 años, un padre, madre o tutor legal deberá acompañarla el día de la cirugía. El padre, madre o tutor legal deberá firmar los formularios de consentimiento para la cirugía.
2. Todas las pacientes deben informar al Dr. Williams y al equipo clínico sobre cualquier posibilidad de embarazo antes de la cirugía. La cirugía, los anestésicos o cualquier otro medicamento pueden dañar significativamente al bebé en desarrollo, especialmente durante el primer trimestre, si está embarazada o planea quedar embarazada.
3. Si usa anticonceptivos orales, es importante comprender que los antibióticos pueden interferir con su eficacia. Por lo tanto, se recomienda un método anticonceptivo adicional, durante un ciclo completo, después de un ciclo de antibióticos. Consulte a su médico para obtener más información.
4. Deje de tomar aspirina o cualquier suplemento, como aceite de pescado y vitamina E, que promueva el sangrado, al menos 3 días antes de la cirugía. Consulte con el Dr. Williams o el equipo clínico sobre otros anticoagulantes.
5. No fumar al menos 48 horas antes de la cirugía.
6. Si padece alguna enfermedad como resfriado, herpes labial, dolor de garganta, malestar estomacal o intestinal, notifique al consultorio.

PARA PACIENTES QUE RECIBEN SEDACIÓN INTRAVENOSA, SE APLICAN INSTRUCCIONES ADICIONALES.

7. Los pacientes NO pueden comer ni beber nada después de la medianoche anterior a la cirugía.
8. Cualquier medicamento que tome habitualmente debe tomarse con un sorbo de agua, a menos que el Dr. Williams indique lo contrario.
9. Si el paciente es menor de 18 años, un padre/tutor legal, y si es mayor de 18 años, un adulto responsable debe acompañar al paciente el día de la cirugía, permanecer en la sala de espera durante todo el procedimiento quirúrgico y llevarlo a casa. Esta persona debe saber conducir, ya que el paciente no podrá hacerlo durante al menos 24 horas después de la sedación. El adulto responsable debe estar presente al inicio de la cirugía y el vehículo debe permanecer en las instalaciones.
10. Se debe usar ropa cómoda, con mangas holgadas o cortas, para facilitar la colocación de la vía intravenosa y administrar la sedación. Además, esto facilitará la colocación del equipo de monitoreo. También se recomienda usar zapatos planos y cómodos. Por seguridad, no use chanclas.
11. Los pacientes no deben usar lentes de contacto el día de la cirugía.
12. No use maquillaje, lápiz labial, joyas ni esmalte de uñas en exceso el día de la cirugía programada. (Es posible que deba quitarse el esmalte de uñas oscuro o las uñas postizas para monitorear su estado durante la cirugía).